

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## EDITION DE LA STATION RHONE - ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3°  
Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C. C. P. LYON 9431-17  
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.  
55, Rue Mazenod — 69 — LYON-3°

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

1er supplément au bulletin N° 126 de Mars 1971

26 Mars 1971

page 8

A - TRAITEMENTS A EFFECTUER OU A RENOUVELER à la suite des fortes précipitations du 18 au 22 mars:

- Monilia de l'abricotier, préforal très important même si les dégâts du gel paraissent importants.
- Charançon de la tige du colza, principalement à la reprise de la croissance.
- Cécidomyie de la lavande, dans les parties basses et moyennes où il avait déjà été conseillé avant les pluies. L'étendre dès réception aux régions élevées.
- Cloque du pêcher, les plus fortes contaminations s'étant produites dans la période du 14 au 22 mars, il n'y a plus lieu actuellement d'appliquer un fongicide contre cette maladie.

B - TRAITEMENTS NOUVEAUX A ENTREPRENDRE

- Acariose et érinose de la vigne: sur les vignes sensibles à ces affections, appliquer au débourrement un soufre micronisé mouillable sur les bourgeons.
- Tavelure du poirier: contre les attaques précoces dues aux conidies contenues dans les pustules des rameaux, appliquer un fongicide dès l'apparition des parties vertes au sommet du bouton (stade C3 à D de Fleckinger).
- Teigne des fleurs du cerisier: sur les seules plantations habituellement sujettes à des attaques sensibles de ce ravageur, appliquer un traitement insecticide dans le seul cas où le traitement d'hiver n'a pas été effectué. On utilisera un oléoparathion, dès réception dans les plantations les plus précoces, ou au gonflement des boutons (apparition de la partie verte des écailles) dans les autres cas.
- Monilia sur cerisier: sur les plantations atteintes dans les deux années écoulées, appliquer (ou adjoindre à l'insecticide) un fongicide au même stade que ci-dessus. Cette application devra être renouvelée avant la floraison.
- Xylébore: dans les quelques secteurs où ce ravageur sévit encore, effectuer une pulvérisation abondante à base de lindane (20 à 25gr/hl de matière active) dès le 3ème jour où la température à l'ombre aura dépassé 18°. Ce traitement concerne particulièrement pommiers et abricotiers.
- Meligèthe du colza: attendre le dégagement des inflorescences.

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux  
A. PITHIoud

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements agricoles  
P. LATARD

Imprimerie de la Station Rhône-Alpes  
Directeur-gérant: L. BOUYX

7103